

# DERMATITE ERPETIFORME COME STRUMENTO DIAGNOSTICO DI MALATTIA CELIACA

**D. Bonciani, V. Bonciolini, A. Verdelli, W. Volpi, E. Antiga, M. Caproni**

Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale, sezione di Dermatologia, Università degli studi di Firenze, Ospedale IOT P.Palagi, Firenze

La dermatite erpetiforme (DE) è una patologia infiammatoria morfologicamente polimorfa e intensamente pruriginosa, a patogenesi auto immunologica, correlata a un'enteropatia digiunale glutine-sensibile, la celiachia.

La DE si verifica raramente nell'infanzia e nei bambini alcune caratteristiche cliniche differiscono dalle manifestazioni tipiche degli adulti. La diagnosi è confermata dall'immunofluorescenza diretta (IFD), che mostra depositi granulari di IgA nel derma papillare.

Solo circa il 20% delle persone con DH hanno sintomi intestinali di malattia celiaca (MC).

Presentiamo il caso di bambina di 5 anni, presentava lesioni papulose intensamente pruriginose associate a lesioni da grattamento, presenti da almeno 6 mesi, in corrispondenza della fronte, del collo, delle spalle, dei gomiti e dei glutei, senza sintomi gastrointestinali. I reperti istologici e l'IFD hanno confermato la diagnosi di DE; inoltre gli autoanticorpi specifici (anti t-TG, anti endomisio) erano positivi.

Questo rappresenta un caso emblematico in cui la biopsia gastrointestinale non si rende necessaria, poiché la diagnosi di certezza di DE è sufficiente a confermare anche quella di MC.