

INQUIETANTE LESIONE DEL VOLTO IN UN UOMO DI RAZZA NERA

¹T. Oranges, ¹A. Janowska, ¹A. Verdelli, ¹S. Rossari, ¹I. Savarese, ¹M. Grazzini, ²D. Massi, ¹V. De Giorgi

¹U.O. Dermatologia 2 - Università di Firenze

²Dipartimento di Patologia Umana ed Oncologia - Università di Firenze

Presentiamo il caso clinico di un uomo, di 33 anni, di origine africana, che giunge alla nostra osservazione per la valutazione di una lesione pigmentata a livello del volto, asintomatica, insorta da circa un anno. Clinicamente la lesione coinvolge il solco naso-genieno di sinistra e si presenta irregolare, piana, di colore marrone scuro. Nella porzione sovra labiale si apprezzano inoltre due aree più scure, palpabili, rotondeggianti. L'esame demoscopico evidenzia uno pseudo - reticolo diffuso e due aree caratterizzate da pigmentazione più scura ed obliterazione degli osti follicolari. Abbiamo effettuato due prelievi biotici con punch da 4 mm, rispettivamente a livello della porzione di lesione piana ed a livello di una delle due porzioni rilevate. Nonostante il pattern demoscopico suggestivo per lesione melanocitaria, l'esame istopatologico ha rivelato la presenza di lichen planus follicolare, associato a nevo dermico. Questo caso clinico sottolinea la difficoltà nella diagnosi differenziale clinica e demoscopica delle lesioni pigmentate del volto, soprattutto nelle persone di colore.