

CARCINOMA BASOCELLULARE DELLA REGIONE PERIOCULARE: TECNICHE RICOSTRUTTIVE.

¹G. Pertusi, ¹M. Gattoni, ¹F. Dardano, ²M.L. Moia

¹ SsvD Dermatologia, ² SC Anatomia Patologica, P.O. S. Andrea, ASL Vercelli, Vercelli

Il 10% circa dei carcinomi basocellulari colpisce la regione perioculare e in ordine di frequenza sono interessate rispettivamente la palpebra inferiore, il canto interno, la palpebra superiore e il canto esterno.

La tecnica d'elezione per l'exeresi di lesioni in tale distretto cutaneo, sede "critica" del volto associata a neoplasie più aggressive con elevato rischio di recidive, è rappresentato dalla chirurgia secondo Mohs poiché garantisce il controllo dei margini laterali e profondi con risparmio di tessuto utile ai fini della successiva riparazione.

In regione perioculare, infatti, è fondamentale una ricostruzione plastica che garantisca un ottimo risultato sia estetico sia funzionale.

Presentiamo differenti tecniche ricostruttive eseguite presso la nostra struttura per riparare brecce operatorie in sede perioculare secondarie all'asportazione di carcinomi basocellulari secondo tecnica di Mohs o secondo chirurgia tradizionale.