



CONDILOMATOSI PERIANALE E VULVARE: CASE-REPORT

Il condiloma acuminato gigante o tumore di Buschke è una lesione rara dall'aspetto vegetativo verrucoide legata all'infezione da papillomavirus umano (HPV) di tipo 6 e 11. Le sedi maggiormente coinvolte da questo tipo di lesione sono la regione perianale (nel 10% dei casi può presentare localizzazione ano-rettale) e quella genitale. I principali fattori di rischio sono rappresentati dall'inizio precoce dell'attività sessuale, dal numero elevato di partner, dai rapporti omosessuali e dall'immunosoppressione. Dopo la trasmissione, che avviene per contatto interumano principalmente per via sessuale, il virus può rimanere silente per mesi o anni, fino a quando meccanismi specifici provocano l'attivazione della replicazione del DNA virale.



NOSTRA ESPERIENZA

Riportiamo il caso clinico di una donna di 72 anni con condilomatosi acuminata perianale, estesa dal solco intergluteo, in dietro, al perineo, in avanti, con coinvolgimento vulvare importante, dato da lesioni di diametro considerevole (circa 3-4 cm). Alcune lesioni erano estese anche in profondità e hanno provocato alterazione del canale anale e invasione dei tessuti adiacenti. Data la potenziale malignità della lesione si è deciso di intervenire chirurgicamente con escissioni abbastanza profonde nel tentativo di limitare quanto più possibile l'infezione, evitare recidive e ripristinare la corretta funzionalità della zona coinvolta. Il follow up a 3 mesi ha evidenziato assenza di recidive, mostrando soltanto la comparsa di una stenosi anale, trattata e risolta successivamente con dilatatori.



Bibliografia

- 1) JC Braga et al. Buschke -Loewenstein tumor: identification of HPV type 6 and 11. An Bras Dermatol. 2012; 87: 131-134.
- 2) A. Delbello et al. Anal canal and rectal condylomatosis: exhaustive proctological examination and STD patients. Acta Dermatoven APA. 2010; 19: 13-16.

