

Carcinoma cuniculato

Nan K ¹, di Meo N¹, Noal C¹, Trevisini S¹, Fadel M¹, Vichi S¹, Damiani G¹, Trevisan G¹

Clinica Dermatologica Ospedali Riuniti di Trieste, Università degli studi di Trieste, Trieste.

Il carcinoma cuniculato è un raro carcinoma squamoso di basso grado, ben differenziato, localmente invasivo, descritto da AIRD nel 1954. I siti più comunemente affetti sono i piedi e l'area orale e ano-genitale. Il carcinoma cuniculato ha una capacità di invasione locale ma lenta e progressiva, e la diagnosi viene spesso sbagliata, richiedendo numerosi prelievi biotici. Le diagnosi differenziali comprendono le verruche plantari, melanomi maligni, sarcoma melanotico. Il quadro istopatologico entra in diagnosi differenziale con quello dell'iperplasia pseudoepiteliomatosa ed il cheratoacantoma. Il trattamento elettivo è l'escissione chirurgica, che deve essere sempre preceduta da un'indagine TC per escludere una possibile estensione ossea della patologia. La tecnica TC si è dimostrata superiore ad altre tecniche radiologiche per valutare un'incipiente invasione ossea.

Riportiamo il caso di un carcinoma cuniculato del piede, inizialmente confuso e trattato senza successo come una lesione verruciforme HPV indotta. Solo un secondo esame istopatologico ha identificato il carcinoma squamoso ben differenziato.