

Linfoma cutaneo papulo-nodulare del tronco

U. **Bottoni**, M. **Rossi**, G. **Donato** (Catanzaro), E. **Berti** (Milano)

Uomo di 67 anni giunge alla nostra osservazione per la presenza di alcune lesioni papulo-nodulari eritematose sparse a livello della parte inferiore del tronco. Il paziente 5 anni prima era stato trattato chirurgicamente per la presenza di un adenocarcinoma della prostata. L'esame istologico di una delle lesioni papulo-nodulari presentava l'aspetto di un infiltrato linfocitario epidermotropo CD3+ CD4+ CD8- CD30- tipo micosi fungoide. Non erano presenti chiazze o placche sul resto del corpo mentre i linfonodi delle stazioni superficiali così come gli organi viscerali non presentavano alterazioni patologiche. Il trattamento locale con clobetasolo crema portava alla risoluzione della obiettività cutanea che tale si manteneva dopo 18 mesi.

In base a dati clinici ed istopatologici si orientava la diagnosi verso una forma di "papular mycosis fungoides" Papular MF è una variante di MF in fase iniziale caratterizzata dalla presenza di papule-noduli di 1-10 mm di diametro invece delle classiche chiazze e placche della forma classica. Descritta la prima volta nel 2005 da Kodama ne sono stati descritti in letteratura fino ad ora meno di 20 casi. La diagnosi differenziale viene posta essenzialmente nei confronti della papulosa linfomatoide della pitiriasi lichenoidale e della PLEVA. Questi quadri sono però caratterizzati da aspetti vari di vasculite che nella maggior parte dei casi portano ad ulcerazione, ulcerazione tipicamente assente nelle lesioni del nostro paziente