

I Pemfigoidi atipici

A. Parodi, E. Cozzani, G. Gasparini

DISSAL Sezione Di Dermatologia, Università di Genova
IRCCS AOU San Martino-IST Genova

La presentazione clinica più comune del Pemfigoide Bolloso (PB) è caratterizzata da bolle tese che spesso insorgono su cute eritematosa, che evolvono in erosioni che si ricoprono di croste e quindi risolvono senza lasciare esiti cicatriziali. Tuttavia a volte il PB può presentarsi con lesioni atipiche a volte senza manifestazioni bollose ma solo con placche eritematose, eczematose o orticarioidi, molto pruriginose che durano per molto tempo. A volte l'aspetto clinico può ricordare l'eritema multiforme o la prurigo nodulare o la disidrosi. Altre volte le lesioni possono essere francamente vegetanti. La diagnosi di certezza, sia nella forma classica che nelle forme atipiche, si pone con l'immunofluorescenza diretta che evidenzia, in cute peri-lesionale, la presenza di un deposito continuo di IgG e/o C3 alla giunzione dermo-epidermica e la presenza di anticorpi circolanti diretti verso l'antigene maggiore o minore di 230 e 180 KDa. Nella presentazione verranno discusse i diversi aspetti clinici dei PB atipici che, sebbene rari, devono essere diagnosticati correttamente per l'impostazione del corretto trattamento.